

19



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



11 Veröffentlichungsnummer: **0 539 806 A1**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: **92117675.6**

51 Int. Cl.⁵: **C07D 285/16, A61K 31/54**

22 Anmeldetag: **16.10.92**

30 Priorität: **23.10.91 DE 4134893**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
05.05.93 Patentblatt 93/18


84 Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE**

71 Anmelder: **MERCK PATENT GESELLSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
Frankfurter Strasse 250
W- 6100 Darmstadt(DE)**

72 Erfinder: **Jonas, Rochus, Dr.
Stormstrasse 7
W- 6100 Darmstadt(DE)
Erfinder: Klockow, Michael
Steinackerstrasse 12
W- 6101 Rossdorf(DE)
Erfinder: Leibrock, Joachim, Dr.
Rolandhöfstrasse 14
W- 6102 Pfungstadt(DE)
Erfinder: Schliep, Hans- Jochen, Dr.
Weingartenstrasse 16
W- 6109 Mühlthal- Tralsen(DE)
Erfinder: Seyfried, Christoph, Dr.
Mathildenstrasse 6
W- 6104 Seeheim- Jugendheim(DE)
Erfinder: Wolf, Michael, Dr.
Nussbaumallee 59
W- 6100 Darmstadt(DE)**

54 **Thiadiazinone und sie enthaltende Arzneimittel, insbesondere mit Positiv- Inotroper und vasodilatierender Wirksamkeit.**

57 **Thiadiazinone der Formel I**




I

worin R₄ Chlor- oder Fluoralkoxy bedeutet zeigen positiv inotrope Wirkungen, wirken antiasthmatisch, und eignen sich zur Bekämpfung von kardiovaskulären Erkrankungen.

EP 0 539 806 A1

Die Erfindung betrifft neue Thiadiazinonderivate der Formel I



I

worin

- R¹ und R² jeweils unabhängig voneinander H oder A,
 R³ H, OA oder O - C_mH_{2m+1-n}X_n,
 R⁴ - O - C_mH_{2m+1-n}X_n,
 X F oder Cl,
 A Alkyl mit 1 - 6 C - Atomen,
 m 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 und
 n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oder 13

bedeuten,

sowie deren Salze.

Thiadiazinone sind aus DE 37 19 031 A1 bekannt.

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, neue Verbindungen mit wertvollen Eigenschaften aufzufinden, insbesondere solche, die zur Herstellung von Arzneimitteln verwendet werden können.


Es wurde gefunden, daß die Verbindungen der Formel I bei guter Verträglichkeit wertvolle pharmakologische Eigenschaften besitzen. Insbesondere zeigen sie eine Wirkung auf die Herzkraft (positiv inotrope Wirksamkeit); ferner wirken die Substanzen vasodilatierend und fördern daher die Durchblutung. Die vasodilatierende und die Herzwirkung kann z.B. an narkotisierten oder wachen Hunden, Katzen, Affen oder Minischweinen, die positiv inotrope Wirkung auch an isolierten Herzpräparationen (z.B. Vorhof, Papillarmuskel oder perfundiertes Ganzherz) von Ratte, Meerschweinchen, Katze oder Hund ermittelt werden, z.B. nach Methoden, wie sie in Arzneimittelforschung, Band 31 (I) Nr. 1a (1981), Seiten 141 bis 170, oder von Schliep et al. im 9th International Congress of Pharmacol., London, Abstracts of papers 9P, beschrieben sind.

Weiter können die Verbindungen zur Behandlung von asthmatischen Erkrankungen eingesetzt werden. Die antiasthmatische Wirkung kann z.B. nach der Methode von T. Olsson, Acta Allergologica 26, 438 - 447 (1971), bestimmt werden.

Die Verbindungen wirken ferner cerebroprotektiv, können zur Behandlung von Gedächtnisstörungen eingesetzt werden und haben antidepressive sowie antiphlogistische Eigenschaften.

Die Verbindungen können daher als Arzneimittelwirkstoffe in der Human- und Veterinärmedizin verwendet werden. Ferner können sie als Zwischenprodukte zur Herstellung weiterer Arzneimittelwirkstoffe verwendet werden.

Gegenstand der Erfindung sind dementsprechend die Verbindungen der Formel I sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel II,



II

worin R¹, R², R³ und R⁴ die angegebenen Bedeutungen haben und

Z Br, Cl, I oder eine reaktionsfähig veresterte OH - Gruppe bedeutet, mit einer Verbindung der Formel III



worin

R⁵ A, Ammonium, Na oder K bedeutet
und A die angegebene Bedeutung hat,
umsetzt

und/oder daß man gegebenenfalls eine Verbindung, die der Formel I entspricht, jedoch anstelle von R³
5 und/oder R⁴ eine oder zwei freie OH-Gruppen enthält, mit einer Verbindung der Formel R³-Z bzw. R⁴-Z,
worin R³, R⁴ und Z die angegebenen Bedeutungen haben, umsetzt und/oder eine Base der Formel I durch
Behandeln mit einer Säure in eines ihrer Salze umwandelt.

Vor- und nachstehend haben die Reste R¹ bis R⁴, R⁵, A, X und Z sowie die Parameter m und n die
10 bei den Formeln I, II und III angegebenen Bedeutungen, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben
ist.

In den Formeln ist Alkyl vorzugsweise unverzweigt, hat vorzugsweise 1, 2, 3 oder 4 C-Atome und steht
bevorzugt für Methyl, ferner bevorzugt für Ethyl oder Propyl, weiterhin bevorzugt für Isopropyl, Butyl,
Isobutyl, sek.-Butyl, tert.-Butyl, aber auch für n-Pentyl oder Isopentyl.

Alkoxy ist vorzugsweise unverzweigt, hat vorzugsweise 1, 2 oder 3 C-Atome und steht bevorzugt für
15 Methoxy, ferner bevorzugt für Ethoxy oder Propoxy, weiterhin z.B. für Isopropoxy, Butoxy, Isobutoxy, sek.-
Butoxy, tert.-Butoxy, Pentoxy oder Isopentoxy.

Die Reste R¹, R², R³ und R⁴ haben im einzelnen die folgenden bevorzugten Bedeutungen: R¹ H; R²
Methyl oder Ethyl; R³ Methoxy und R⁴ Difluormethoxy. Falls die Reste R³ und/oder R⁴ von H verschieden
sind, stehen sie vorzugsweise in 3- oder 4-Stellung des Phenylrings. Der Rest X ist vorzugsweise F.

20 Die Parameter m und n sind bevorzugt 1, 2 oder 3, wobei n ferner noch vorzugsweise 4, 5, 6 oder 7
sein kann.

Gegenstand der Erfindung sind insbesondere diejenigen Verbindungen der Formel I, in denen minde-
stens einer der genannten Reste eine der vorstehend angegebenen bevorzugten Bedeutungen hat. Einige
bevorzugte Gruppen von Verbindungen können durch die folgenden Teilformeln Ia bis Id ausgedrückt
25 werden, die der Formel I entsprechen und worin die nicht näher bezeichneten Reste die bei der Formel I
angegebene Bedeutung haben, worin jedoch

in Ia R³ in 4- und R⁴ in 3-Stellung des Phenylrings steht,

30 R¹ H,
R² H oder Alkyl,
R³ OCHF₂ und
R⁴ OA bedeuten;

in Ib R³ in 4- und R⁴ in 3-Stellung des Phenylrings steht,

35 R¹ H,
R² Methyl oder Ethyl,
R³ OCHF₂ und
R⁴ OA bedeuten;

in Ic R³ in 4- und R⁴ in 3-Stellung des Phenylrings steht,

40 R¹ H,
R² Methyl oder Ethyl,
R³ OCHF₂, OCF₃, OC₂H_{5-n}F_n, wobei n = 1, 2, 3, 4 oder 5 ist und
R⁴ OA bedeuten;

in Id R³ in 4- und R⁴ in 3-Stellung des Phenylrings steht

45 R¹ H,
R² H, Methyl oder Ethyl,
R³ OCHF₂, OCF₃, OC₂H_{5-n}F_n, OC₃H_{7-n}F_n, OC₄H_{9-n}F_n, wobei n = 1, 2, 3, 4 oder 5, für OC₃H_{7-n}F_n
und OC₄H_{9-n}F_n auch 6 oder 7 und für OC₄H_{9-n}F_n ebenfalls 8 oder 9 ist und
R⁴ OMe oder OEt bedeuten.

Die Verbindungen der Formel I werden im übrigen nach an sich bekannten Methoden hergestellt, wie
sie in der Literatur (z.B. in den Standardwerken wie Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie,
50 Georg-Thieme-Verlag, Stuttgart) beschrieben sind, und zwar unter Reaktionsbedingungen, die für die
genannten Umsetzungen bekannt und geeignet sind. Dabei kann man auch von an sich bekannten, hier
nicht näher erwähnten Varianten Gebrauch machen.

In den Verbindungen der Formel II haben R¹, R², R³ und R⁴ die angegebenen Bedeutungen, während Z
bevorzugt für Cl oder Br steht. Falls X eine reaktionsfähig veresterte OH-Gruppe bedeutet, so ist diese
55 vorzugsweise Alkylsulfonyloxy mit 1-6 C-Atomen, z.B. Methansulfonyloxy oder Arylsulfonyloxy mit 6-10
C-Atomen, z.B. Benzol-, p-Toluol- oder 1- oder 2-Naphthalinsulfonyloxy.

In den Verbindungen der Formel III steht R⁵ bevorzugt für Methyl oder Ethyl, aber auch für Na, K oder
Ammonium.

Die Ausgangsstoffe können gewünschtenfalls auch in situ gebildet werden, derart, daß man sie aus dem Reaktionsgemisch nicht isoliert, sondern sofort weiter zu den Verbindungen der Formel I umsetzt. Andererseits ist es möglich, die Reaktion stufenweise durchzuführen, wobei man weitere Zwischenprodukte isolieren kann.

Die Ausgangsstoffe der Formeln II und III sind teilweise bekannt. Sofern sie nicht bekannt sind können sie nach an sich bekannten Methoden hergestellt werden. Die Ketone der Formel II sind beispielsweise durch Friedel-Crafts-Synthese aus den entsprechenden Phenylderivaten mit Verbindungen der Formel $Y-CO-CR^1R^2-Z$, wobei Y Cl oder Br bedeutet, zugänglich.

Im einzelnen erfolgt die Umsetzung der Ketone der Formel II mit den Verbindungen der Formel III in Gegenwart oder Abwesenheit eines inerten Lösungsmittels bei Temperaturen zwischen etwa -20 und etwa $+150^\circ$, vorzugsweise zwischen 20 und 100° . Als Lösungsmittel eignen sich beispielsweise Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol, Xylol oder Mesitylen; halogenierte Kohlenwasserstoffe wie Dichlormethan, Trichlorethylen oder Chlorbenzol; Alkohole wie Methanol, Ethanol oder Isopropanol; Glykole und Glykolether wie Ethylenglykol, Diethylenglykol, 2-Methoxyethanol; Nitrile wie Acetonitril; Ether wie Tetrahydrofuran oder Dioxan; Amide wie Dimethylformamid (DMF); Sulfoxide wie Dimethylsulfoxid. Auch Gemische dieser Lösungsmittel sind geeignet.

Ebenso ist es möglich eine Verbindung, die der Formel I entspricht, jedoch anstelle von R^3 und/oder R^4 eine oder zwei freie OH-Gruppen enthält, mit einer Verbindung der Formel R^3-Z bzw. R^4-Z , worin R^3 , R^4 sowie Z die angegebenen Bedeutungen haben, umzusetzen. Die Veretherung der OH-Gruppen erfolgt nach an sich bekannten Methoden, wie sie in Standardwerken der chemischen Literatur (z.B. in Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart oder in Organic Reactions, John Wiley & Sons Inc., New York) beschrieben sind, und zwar unter Reaktionsbedingungen, wie sie für die genannten Umsetzungen bekannt und geeignet sind. Dabei kann auch von an sich bekannten, hier nicht näher erwähnten Varianten Gebrauch gemacht werden.

Verbindungen der Formel I können eine oder mehrere Asymmetriezentren enthalten. In diesem Fall liegen sie gewöhnlich in racemischer Form vor. Erhaltene Racemate können nach an sich bekannten Methoden mechanisch oder chemisch in ihre optischen Antipoden getrennt werden. Vorzugsweise werden aus dem racemischen Gemisch durch Umsetzung mit einem optischaktiven Trennmittel Diastereomere gebildet.

Natürlich ist es auch möglich, optisch aktive Verbindungen der Formel I nach den oben beschriebenen Methoden zu erhalten, indem man Ausgangsstoffe verwendet, die bereits optisch aktiv sind.

Gegenstand der Erfindung ist ferner die Verwendung der Verbindungen der Formel I und ihrer physiologisch unbedenklichen Salze zur Herstellung pharmazeutischer Zubereitungen, insbesondere auf nicht-chemischem Wege. Hierbei können sie zusammen mit mindestens einem festen, flüssigen und/oder halbflüssigen Träger- oder Hilfsstoff und gegebenenfalls in Kombination mit einem oder mehreren weiteren Wirkstoffen in eine geeignete Dosierungsform gebracht werden.

Gegenstand der Erfindung sind ferner Mittel, insbesondere pharmazeutische Zubereitungen, enthaltend mindestens eine Verbindung der Formel I und/oder eines ihrer physiologisch unbedenklichen Salze.

Diese Zubereitungen können als Arzneimittel in der Human- oder Veterinärmedizin verwendet werden.

Als Trägerstoffe kommen organische oder anorganische Substanzen in Frage, die sich für die enterale (z.B. orale), parenterale oder topische Applikation eignen und mit den neuen Verbindungen nicht reagieren, beispielsweise Wasser, pflanzliche Öle, Benzylalkohole, Polyethylenglykole, Glycerintriacetat, Gelatine, Kohlehydrate wie Lactose oder Stärke, Magnesiumstearat, Talk, Vaseline. Zur oralen Anwendung dienen insbesondere Tabletten, Dragees, Kapseln, Sirupe, Säfte oder Tropfen, zur rektalen Anwendung Suppositorien, zur parenteralen Anwendung Lösungen, vorzugsweise ölige oder wässrige Lösungen, ferner Suspensionen, Emulsionen oder Implantate, für die topische Anwendung Salben, Cremes oder Puder. Die neuen Verbindungen können auch lyophilisiert und die erhaltenen Lyophilisate z.B. zur Herstellung von Injektionspräparaten verwendet werden. Die angegebenen Zubereitungen können sterilisiert sein und/oder Hilfsstoffe wie Gleit-, Konservierungs-, Stabilisierungs- und/oder Netzmittel, Emulgatoren, Salze zur Beeinflussung des osmotischen Druckes, Puffersubstanzen, Farb-, Geschmacks- und/oder Aromastoffe enthalten. Sie können, falls erwünscht, auch einen oder mehrere weitere Wirkstoffe enthalten, z.B. ein oder mehrere Vitamine.

Die Verbindungen der Formel I können bei der Bekämpfung von Krankheiten, insbesondere von Herzinsuffizienz, sowie bei der therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers verwendet werden.

Dabei werden die erfindungsgemäßen Substanzen in der Regel in Analogie zu bekannten positiv inotrop wirksamen Substanzen wie Amrinon verabreicht, vorzugsweise in Dosierungen zwischen etwa 1 und 100 mg, insbesondere zwischen 2 und 20 mg pro Dosierungseinheit. Die tägliche Dosierung liegt vorzugsweise

zwischen etwa 0,02 und 2 mg/kg Körpergewicht. Die spezielle Dosis für jeden bestimmten Patienten hängt jedoch von den verschiedensten Faktoren ab, beispielsweise von der Wirksamkeit der eingesetzten speziellen Verbindung, vom Alter, Körpergewicht, allgemeinen Gesundheitszustand, Geschlecht, von der Kost, vom Verabfolgungszeitpunkt und -weg, von der Ausscheidungsgeschwindigkeit, Arzneistoffkombination und Schwere der jeweiligen Erkrankung, welcher die Therapie gilt. Die orale Applikation ist bevorzugt. Im Vergleich zu den bisher zur Therapie der Herzinsuffizienz verwendeten Digitalis-Glykosiden zeichnen sich die Verbindungen der Formel I durch verbesserte therapeutische Breite und periphere Entlastung aus.

In den nachfolgenden Beispielen bedeutet "übliche Aufarbeitung":

Man gibt, falls erforderlich, Wasser oder verdünnte Natronlauge hinzu, extrahiert mit einem organischen Lösungsmittel wie Ethylacetat, Chloroform oder Dichlormethan, trennt ab, trocknet die organische Phase über Natriumsulfat, filtriert, dampft ein und reinigt durch Chromatographie und/oder Kristallisation.

Vor- und nachstehend sind alle Temperaturen in Celsiusgraden angegeben.

Beispiel 1

Eine Lösung von 7,0 g 1-(3-Methoxy-4-difluormethoxy-phenyl)-2-brombutan-1-on [erhältlich durch Veretherung von 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-butan-1-on mit Chlordifluormethan und nachfolgende Bromierung] in 50 ml Acetonitril wird mit 2,6 g Hydrazinthioameisensäuremethylester zwei Std. gekocht.

Anschließend wird das Lösungsmittel im Vakuum entfernt und wie üblich aufgearbeitet. Man erhält 5-(3-Methoxy-4-difluormethoxyphenyl)-6-ethyl-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on, F. 97°.

Analog erhält man durch Umsetzung von Hydrazinthioameisensäuremethylester mit

1-(3-Methoxy-4-trifluormethoxy-phenyl)-2-brombutan-1-on:

5-(3-Methoxy-4-trifluormethoxyphenyl)-6-ethyl-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on;

1-(3-Methoxy-4-trifluormethoxy-phenyl)-2-brompropan-1-on:

5-(3-Methoxy-4-trifluormethoxyphenyl)-6-methyl-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on;

1-(3-Methoxy-4-difluormethoxy-phenyl)-2-brompropan-1-on:

5-(3-Methoxy-4-difluormethoxyphenyl)-6-methyl-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on;

1-[3-Methoxy-4-(1,1,2-tetrafluorethoxy)-phenyl]-2-brombutan-1-on:

5-[3-Methoxy-4-(1,1,2-tetrafluorethoxy)-phenyl]-6-ethyl-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on;

1-(3-Methoxy-4-chlormethoxy-phenyl)-2-brombutan-1-on:

5-(3-Methoxy-4-chlormethoxyphenyl)-6-ethyl-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on;

1-(3-Methoxy-4-chlormethoxy-phenyl)-2-brompropan-1-on:

5-(3-Methoxy-4-chlormethoxyphenyl)-6-methyl-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on;

1-(3-Methoxy-4-pentachlorethoxy-phenyl)-2-brombutan-1-on:

5-(3-Methoxy-4-pentachlorethoxyphenyl)-6-ethyl-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on;

1-(3-Methoxy-4-trifluormethoxy-phenyl)-2-brompentan-1-on:

5-(3-Methoxy-4-trifluormethoxyphenyl)-6-propyl-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on;

1-(3-Methoxy-4-difluormethoxy-phenyl)-2-brompentan-1-on:

5-(3-Methoxy-4-difluormethoxyphenyl)-6-propyl-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on;

1-[3-Methoxy-4-(1,1,2-trifluorethoxy)-phenyl]-2-brombutan-1-on:

5-[3-Methoxy-4-(1,1,2-trifluorethoxy)-phenyl]-6-ethyl-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on;

1-[3-Methoxy-4-(1,1,2-trifluorethoxy)-phenyl]-2-brompropan-1-on:

5-[3-Methoxy-4-(1,1,2-trifluorethoxy)-phenyl]-6-methyl-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on.

Beispiel 2

Analog Beispiel 1 erhält man durch Umsetzung von Hydrazinthioameisensäuremethylester mit 1-(4-Difluormethoxy-3-methoxyphenyl)-2-bromethan-1-on: 5-(3-Methoxy-4-difluormethoxyphenyl)-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on, F. 120°.

Analog erhält man durch Umsetzung von Hydrazinthioameisensäuremethylester mit

1-(3-Methoxy-4-trifluormethoxy-phenyl)-2-bromethan-1-on:

5-(3-Methoxy-4-trifluormethoxyphenyl)-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on;

1-(4-Trifluormethoxyphenyl)-2-bromethan-1-on:

5-(4-Trifluormethoxyphenyl)-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on;

1-(3-Methoxy-4-difluormethoxy-phenyl)-2-bromethan-1-on:

5-(3-Methoxy-4-difluormethoxyphenyl)-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on;

1-[3-Methoxy-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)-phenyl]-2-bromethan-1-on:

5-[3-Methoxy-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)-phenyl]-2-bromethan-1-on:

5 - [3 - Methoxy - 4 - (1,1,2,2 - tetrafluorethoxy) - phenyl] - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on; 1 -
 (3 - Methoxy - 4 - chlormethoxy - phenyl) - 2 - bromethan - 1 - on:
 5 - (3 - Methoxy - 4 - chlormethoxy - phenyl) - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on; 1 - (3 -
 Methoxy - 4 - trichlormethoxy - phenyl) - 2 - bromethan - 1 - on:
 5 5 - (3 - Methoxy - 4 - trichlormethoxy - phenyl) - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on; 1 - (3 -
 Methoxy - 4 - pentachlorethoxy - phenyl) - 2 - bromethan - 1 - on:
 5 - (3 - Methoxy - 4 - pentachlorethoxy - phenyl) - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on; 1 - (4 - Di -
 fluormethoxyphenyl) - 2 - bromethan - 1 - on:
 5 - (4 - Difluormethoxyphenyl) - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on.

10

Beispiel 3

Eine Lösung von 5,4 g 5 - (3 - Methoxy - 4 - hydroxy - phenyl) - 6 - ethyl - 3,6 - dihydro - 1,3,4 -
 thiadiazin - 2 - on [erhältlich durch Umsetzung von 1 - (4 - Hydroxy - 3 - methoxyphenyl) - 2 - brombutan -
 15 1 - on mit Hydrazinthioameisensäuremethylester] in THF wird nach Zugabe von einem Äquivalent 3 - Iod -
 1,1,2,2,3 - pentafluorpropan zwei Std. gekocht. Anschließend wird das Lösungsmittel im Vakuum entfernt
 und wie üblich aufgearbeitet. Man erhält 5 - [3 - Methoxy - 4 - (1,1,2,2,3 - pentafluorpropoxy - phenyl)] - 6 -
 ethyl - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on.

Analog erhält man durch Veretherung der entsprechenden Mono - oder Dihydroxy - phenyl - 1,3,4 -
 20 thiadiazinonderivate mit Polyfluoralkylhalogeniden:

5 - (3 - Methoxy - 4 - trifluormethoxy - phenyl) - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on;
 5 - (4 - Trifluormethoxy - phenyl) - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on;
 5 - [Bis - 3,4 - (difluormethoxy) - phenyl] - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on;
 5 - [3 - Methoxy - 4 - (1,1,2 - trifluorethoxy) - phenyl] - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on;
 25 5 - [Bis - 3,4 - (dichlormethoxy) - phenyl] - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on.

Beispiel 4

Analog Beispiel 1 erhält man durch Umsetzung von Hydrazinthioameisensäuremethylester mit 1 - [Bis -
 30 3,4 - (difluormethoxy) - phenyl] - 2 - bromethan - 1 - on 5 - [Bis - 3,4 - (difluormethoxy) - phenyl] - 3,6 -
 dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on.

Analog erhält man durch Umsetzung von Hydrazinthioameisensäuremethylester mit

1 - [Bis - 3,4 - (trifluormethoxy) - phenyl] - 2 - bromethan - 1 - on:
 5 - [Di - (3,4 - trifluormethoxy) - phenyl] - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on;
 35 1 - [Bis - 3,4 - (1,2 - difluorethoxy) - phenyl] - 2 - bromethan - 1 - on:
 5 - [Bis - 3,4 - (1,2 - difluorethoxy) - phenyl] - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on;
 1 - [3 - Ethoxy - 4 - (1,1,2,2 - tetrafluorethoxy) - phenyl] - 2 - bromethan - 1 - on:
 5 - [3 - Ethoxy - 4 - (1,1,2,2 - tetrafluorethoxy) - phenyl] - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on;
 1 - [3 - Methoxy - 4 - (1,2,2 - Trichlorethoxy) - phenyl] - 2 - bromethan - 1 - on:
 40 5 - [3 - Methoxy - 4 - (1,2,2 - trichlorethoxy) - phenyl] - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on.

Beispiel 5

Analog Beispiel 1 erhält man durch Umsetzung von Hydrazinthioameisensäuremethylester mit:

45 1 - (2 - Methoxy - 3 - difluormethoxy - phenyl) - 2 - bromethan - 1 - on:
 5 - (2 - Methoxy - 3 - difluormethoxy - phenyl) - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on;
 1 - (2 - Ethoxy - 4 - trifluormethoxy - phenyl) - 2 - bromethan - 1 - on:
 5 - (2 - Ethoxy - 4 - trifluormethoxy - phenyl) - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on;
 1 - (2 - Trifluormethoxy - phenyl) - 2 - bromethan - 1 - on:
 50 5 - (2 - Trifluormethoxy - phenyl) - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on;
 1 - (2 - Ethoxy - 3 - difluormethoxy - phenyl) - 2 - bromethan - 1 - on:
 5 - (2 - Ethoxy - 3 - difluormethoxy - phenyl) - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on;
 1 - [2 - (1,1,2,2 - Tetrafluorethoxy) - phenyl] - 2 - bromethan - 1 - on:
 5 - [2 - (1,1,2,2 - Tetrafluorethoxy) - phenyl] - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on;
 55 1 - (3 - Methoxy - 5 - chlormethoxy - phenyl) - 2 - bromethan - 1 - on:
 5 - (3 - Methoxy - 5 - chlormethoxy - phenyl) - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on;
 1 - (3 - Methoxy - 5 - trichlormethoxy - phenyl) - 2 - bromethan - 1 - on:
 5 - (3 - Methoxy - 5 - trichlormethoxy - phenyl) - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on;

- 1 - (2 - Methoxy - 4 - pentachlorethoxy - phenyl) - 2 - bromethan - 1 - on;
 5 - (2 - Methoxy - 4 - pentachlorethoxy - phenyl) - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on;
 1 - (2 - Difluormethoxy - phenyl) - 2 - bromethan - 1 - on;
 5 - (2 - Difluormethoxy - phenyl) - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on.

5

Beispiel 6

- Analog Beispiel 1 erhält man durch Umsetzung von Hydrazinthioameisensäuremethylester mit 1 - [4 - (2,2,2 - Trifluorethoxy) - phenyl] - 2 - brombutan - 1 - on das 5 - [4 - (2,2,2 - Trifluorethoxy) - phenyl] - 6 - ethyl - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on, F. 102°.

- Analog erhält man
 mit 1 - [3 - Methoxy - 4 - (2,2,2 - trifluorethoxy) - phenyl] - 2 - brombutan - 1 - on:
 5 - [3 - Methoxy - 4 - (2,2,2 - trifluorethoxy) - phenyl] - 6 - ethyl - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on, F. 123 - 125°;
 mit 1 - [3 - Methoxy - 4 - (2,2,2 - trifluorethoxy) - phenyl] - 2 - bromethan - 1 - on:
 5 - [3 - Methoxy - 4 - (2,2,2 - trifluorethoxy) - phenyl] - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on, F. 120°;
 mit 1 - [3 - (2,2,2 - Trifluorethoxy) - 4 - methoxy - phenyl] - 2 - brombutan - 1 - on:
 5 - [3 - (2,2,2 - Trifluorethoxy) - 4 - methoxy - phenyl] - 6 - ethyl - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on, F. 120 - 121°;
 mit 1 - [3 - Difluormethoxy - 4 - methoxy - phenyl] - 2 - brombutan - 1 - on:
 5 - (3 - Difluormethoxy - 4 - methoxy - phenyl) - 6 - ethyl - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on, F. 105°.

Beispiel 7

- Durch chromatographische Enantiomerentrennung unter Verwendung einer chiralen stationären Phase (ChiraSpher®) erhält man ausgehend von racemischem 5 - (3 - Methoxy - 4 - difluormethoxyphenyl) - 6 - ethyl - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on [F. 97°; erhältlich nach Bsp. 1]:
 (+) - 5 - (3 - Methoxy - 4 - difluormethoxy - phenyl) - 6 - ethyl - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on
 und
 (-) - 5 - (3 - Methoxy - 4 - difluormethoxy - phenyl) - 6 - ethyl - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on.
 Analog erhält man ausgehend von racemischem 5 - [3 - (2,2,2 - Trifluorethoxy) - 4 - methoxy - phenyl] - 6 - ethyl - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on [F. 120 - 121°; erhältlich nach Bsp. 6]:
 (+) - 5 - [3 - (2,2,2 - Trifluorethoxy) - 4 - methoxy - phenyl] - 6 - ethyl - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on
 und
 (-) - 5 - [3 - (2,2,2 - Trifluorethoxy) - 4 - methoxy - phenyl] - 6 - ethyl - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on.

Die nachstehenden Beispiele betreffen pharmazeutische Zubereitungen, die Verbindungen der Formel I oder ihre Säureadditionssalze enthalten:

40

Beispiel A: Tabletten

- Ein Gemisch von 1 kg 5 - (3 - Methoxy - 4 - difluormethoxy - phenyl) - 6 - ethyl - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on, 10 kg Lactose, 6 kg mikrokristalline Cellulose, 6 kg Kartoffelstärke, 1 kg Polyvinylpyrrolidon, 0,8 kg Talk und 0,1 kg Magnesiumstearat wird in üblicher Weise zu Tabletten gepreßt, derart, daß jede Tablette 10 mg Wirkstoff enthält.

Beispiel B: Dragees

- Analog Beispiel A werden Tabletten gepreßt, die anschließend in üblicher Weise mit einem Überzug aus Saccharose, Kartoffelstärke, Talk, Tragant und Farbstoff überzogen werden.


Beispiel C: Kapseln

- 1 kg 5 - (3 - Methoxy - 4 - difluormethoxy - phenyl) - 3,6 - dihydro - 1,3,4 - thiadiazin - 2 - on wird in üblicher Weise in Hartgelatine kapseln gefüllt, so daß jede Kapsel 5 mg Wirkstoff enthält.

Beispiel D: Ampullen

Eine Lösung von 1 kg 5-(3-Methoxy-4-difluormethoxy-phenyl)-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on in 30 l 1,2-Propandiol wird steril filtriert, in Ampullen abgefüllt, unter sterilen Bedingungen lyophilisiert und steril verschlossen. Jede Ampulle enthält 2 mg Wirkstoff.

Analog sind Tabletten, Dragees, Kapseln und Ampullen erhältlich, die einen oder mehrere der übrigen Wirkstoffe der Formel I und/oder ihre physiologisch unbedenklichen Säureadditionssalze enthalten.

Patentansprüche**1. Thiadiazinonderivate der Formel I**

I

worin


- | | |
|-----------------------------------|--|
| R ¹ und R ² | jeweils unabhängig voneinander H oder A, |
| R ³ | H, OA oder O-C _m H _{2m+1-n} X _n , |
| R ⁴ | -O-C _m H _{2m+1-n} X _n , |
| X | F oder Cl, |
| A | Alkyl mit 1-6 C-Atomen, |
| m | 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 und |
| n | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oder 13 |

bedeuten,

sowie deren Salze.

2.

- 5-(3-Methoxy-4-difluormethoxy-phenyl)-6-ethyl-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on;
- 5-(3-Methoxy-4-difluormethoxy-phenyl)-3,6-dihydro-1,3,4-thiadiazin-2-on.

3. Verfahren zur Herstellung von Thiadiazinonen der Formel I nach Anspruch 1 sowie von deren Salzen, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel II

II

worin R¹, R², R³ und R⁴ die angegebenen Bedeutungen haben und

Z Br, Cl, I oder eine reaktionsfähig veresterte OH-Gruppe bedeutet, mit einer Verbindung der Formel III



worin

R⁵ A, Ammonium, Na oder K bedeutet

und A die angegebene Bedeutung hat,
umsetzt,

und/oder daß man gegebenenfalls eine Verbindung, die der Formel I entspricht, jedoch anstelle von R³
und/oder R⁴ eine oder zwei freie OH-Gruppen enthält, mit einer Verbindung der Formel R³-Z bzw.
5 R⁴-Z, worin R³, R⁴ und Z die angegebenen Bedeutungen haben, umsetzt und/oder eine Base der
Formel I durch Behandeln mit einer Säure in eines ihrer Salze umwandelt.

4. Verfahren zur Herstellung pharmazeutischer Zubereitungen, dadurch gekennzeichnet, daß man eine
Verbindung der Formel I nach Anspruch 1 und/oder eines ihrer physiologisch unbedenklichen Salze
10 zusammen mit mindestens einem festen, flüssigen oder halbflüssigen Träger- oder Hilfsstoff in eine
geeignete Dosierungsform bringt.

5. Pharmazeutische Zubereitung, gekennzeichnet durch einen Gehalt an mindestens einer Verbindung der
Formel I nach Anspruch 1 und/oder einem ihrer physiologisch unbedenklichen Salze.

6. Verwendung einer Verbindung der Formel I nach Anspruch 1 und/oder eines ihrer physiologisch
unbedenklichen Salze zur Herstellung eines Arzneimittels zur Bekämpfung von Krankheiten.

7. Verwendung von Verbindungen der Formel I und/oder ihrer physiologisch unbedenklichen Salze bei der
20 Bekämpfung von Krankheiten.

25

30

35

40

45

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER TEILRECHERCHENBERICHT Nummer der Anmeldung

der nach Regel 45 des Europäischen Patent-
übereinkommens für das weitere Verfahren als
europäischer Recherchenbericht gilt

EP 92 11 7675

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE

Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 5)
X	EP-A-0 080 296 (IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC) * das ganze Dokument, insbesondere Seite 11 und Seite 12, 17. und 18. Verbindung * -----	1-6	C07D285/16 A61K31/54

RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 5)

C07D

UNVOLLSTÄNDIGE RECHERCHE

Nach Auffassung der Recherchenabteilung entspricht die vorliegende europäische Patentanmeldung den Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens so wenig, daß es nicht möglich ist, auf der Grundlage einiger Patentansprüche sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik durchzuführen.

Vollständig recherchierte Patentansprüche:

Unvollständig recherchierte Patentansprüche:

Nicht recherchierte Patentansprüche:

Grund für die Beschränkung der Recherche:

Siehe Ergänzungsblatt C

Recherchenort

DEN HAAG

Abschlußdatum der Recherche

14 JANUAR 1993

Prüfer

ALLARD M.S.

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN

X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer
anderen Veröffentlichung derselben Kategorie
A : technologischer Hintergrund
O : mündliche Offenbarung
P : Zwischenliteratur

T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze
E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder
nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
D : in der Anmeldung angeführtes Dokument
L : aus andern Gründen angeführtes Dokument
.....
& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes
Dokument



EP 92 11 7675 -C-

UNVOLLSTÄNDIGE RECHERCHE

Vollständig recherchierte Patentansprüche : 1-6
Nicht recherchierte Patentansprüche : 7

Grund : Art. 52(4) EPC